Promotor-L 47 تربية الدواجن

أحماض أمينية (أيسرية الدوران) في الشكل الطبيعي الفعال وفيتامينات قابلة للذوبان في الماء

الفيتامينات

في كل لتر من المنتج:

نيكوتيناميد	16.25 غ	فيتامين ب6	1.125 غ
D-بانثينول	7.5 غ	إينوزيتول	2.5 غ
فيتامين ب1 / الثيامين	1.75 غ	بيوتين	1 مغ
فيتامين ب2	2.5 غ		

الأحماض الأمينية

في كل لتر من المنتج:

ل-ألانين:	7.4 غ	ل-سيستين:	4.6 غ	ل-إيزوليوسين:	5.6 غ	ل-برولين:	11.8 غ
ل-أرجينين:	8.6 غ	ل-حمض الجلوتاميك:	17.8 غ	ل-ليوسين:	8.7 غ	ل-سيرين:	12 غ
ل-حمض الأسبارتيك:	10 غ	ل-غليسين:	10.3 غ	ل-ليسين:	7.6 غ	ل-ثريونين:	6.2 غ
ل-فينيل ألانين:	5.8 غ	ل-هيستيدين:	1.5 غ	ل-ميثيونين:	1.8 غ	ل-تيروسين:	3.1 غ
ل-فالين:	9.3 غ	ل-تريبتوفان:	0.6 غ	هيدروكسي برولين:	مقدار ضئيل		

الجرعة وطريقة الاستخدام

- عن طريق الفم من خلال مياه الشرب.
- الأسبوع الأول من الحياة: **1** مل / لتر، لمدة **5** إلى **7** أيام.
- في اللحظات التي تكون فيها الحاجة أكبر (التوتر، ردود الفعل الناتجة عن التلقيح، تقييد التغذية) : من **0.5** إلى **1** مل / لتر.
- أصناف أخرى: **2** مل / **10** كغ من وزن الجسم / اليوم، خلال **4** أو **5** أيام.

دواعي الاستخدام

- عند استقبال الدواجن.
- أثناء فترات التوتر.
- عندما يطرح الدجاج الريش.
- أثناء الاختلالات ونقص التغذية.

التأثيرات

- يحسّن مردودية الإنتاج للدواجن، ويساعد على زيادة الوزن وتخفيض معدل التحويل الغذائي ونسبة الوفيات.
- عند الدجاج البياض واللاحم: يحسّن نسبة وضع البيض والخصوبة وفقس البيض.
- عند الفرخة، يزيد من تجانُس المجموعة ويساعد على تحقيق أوزان قياسية.

CALIER

LABORATORIOS CALIER, S.A.
Barcelonès, 26 (Pol. Ind. El Ramassar)
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona (Spain)
الهاتف: 133 495 938 (34+)
www.calier.es laboratorios@calier.es

ARGENTINA
الهاتف: 674 / 8668 / 3697-4582-5411
calier@calier.com.ar

BRASIL (HERTAPE CALIER)
الهاتف: 4300-3537(31)55+
hertapecalier@hertapecalier.com.br

COLOMBIA
الهاتف: 14107222 (57+)
laboratorios@calierandes.com

DEUTSCHLAND
الهاتف: 6658355 4721 (49+)
info@calier.de

ITALIA
الهاتف: 3319744978 (39+)
info@calier.it

MAROC
الهاتف: 54 08 80 (537 212)
info@calier.ma

MÉXICO
الهاتف: 59-3337774343 (52+)
fmanzano@indukern.com.mx

POLSKA
الهاتف: 521 7214 95 (48+)
calierpolska@calier.com.pl

PORTUGAL
الهاتف: 219248140 (351+)
calier@calier.pt

REPÚBLICA DOMINICANA
الهاتف: 5585-412 (809+)
info@grupoindukern.com.do

URUGUAY
الهاتف: 598 (2) 604 5127 - 598 (2) 606 20 56
laboratorios@calier.com.uy

VENEZUELA
الهاتف: 3228880 244 (58+)
labcalier@cantv.net

*البلدان الأخرى: يُرجى الاتصال بموزعك المحلي أو بالبريد الإلكتروني laboratorios@calier.es

تركيبة
تربية الدواجن
جديدة

لكي تتحقق نتائجك بأقصى قدر ممكن
من الفعالية

Promotor-L 47 تربية الدواجن

أحماض أمينية (أيسرية الدوران) في الشكل الطبيعي الفعال وفيتامينات قابلة للذوبان في الماء

CALIER
ملتزمون برعاية الحيوان

Promotor-L 47 تربية الدواجن

أحماض أمينية (أيسرية الدوران) في الشكل الطبيعي الفعال وفيتامينات قابلة للذوبان في الماء

أحماض أمينية ذات قابلية للهضم عالية

يحتوي على **19** حمضاً أمينياً، الأساسية منها وغير الأساسية، وتُعتبر جميعها لازمة للتنمية المثالية للدواجن. جميع الأحماض الأمينية هي أيسرية الدوران، مما يجعلها قابلة للهضم بشكل كبير.



منتج عالي التركيز

يتم ضبط كمية كل حمض أميني بحيث تشكّل، من دون الإفراط فيها، مكمّلاً مثالياً للنظام الغذائي في لحظات معينة من الدورة الإنتاجية للدواجن.

منتج منافس | Promotor-L 47



منتج غير ممزوج

منتج منافس | Promotor-L47 | منتج منافس



ممزوج **1** مل / لتر

عالي الذوبان

تركيبة قابلة للذوبان بشكل كامل من أجل تحقيق استعمال أفضل، مع تجنّب أي مشاكل في خزّانات وأنابيب المياه. تسبّب منتجات أخرى مع مرور الوقت انسداد الأنابيب أو تُسَرِّع من حدوث هذا المشكل.

ثبات عالٍ

يفتقر إلى أي عنصر سهل التدهور، مثل الفيتامينات الذائبة في الدهون، التي قد تسبب انسداد الأنابيب أو تشكيل بيوفيلم (غشاء حيوي رقيق).
تبقى الجودة سليمة لفترة أطول ولا تَحدُث تفاعلات من شأنها الإخلال بجودة الماء.

تركيبة متوازنة

يلبي احتياجات الدواجن بما يتماشى مع مفهوم "البروتين المثالي". لكي تحصل الدواجن على الكمية اللازمة، لا أكثر ولا أقل، من كل حمض أميني.

تركيز Promotor-L 47 (في الماء العسر)



1. غير ممزوج
2. **1** مل / لتر
3. **0,5** مل / لتر

Promotor-L 47 بدون طبقة زيتية | منتج منافس



في المنتجات الأخرى تظهر طبقة زيتية بعد **24** ساعة



يطوّر معايير الأداء في مشاريع الإنتاج الحيواني

دجاج بياض





- تجانس أفضل
- زيادة إنتاج البيض
- نسبة أقل من الوفيات
- انخفاض معدل التحويل الغذائي

أُجري الاختبار في إسبانيا. سلالة لوهمان *LSL*. طريقة الاستخدام المتبعة: ابتداءً من الأسبوع *18* لغاية الأسبوع *70*، تُقدَّم جرعة *1* مل / لتر من مياه الشرب كل *4* أسابيع. أبريل *2011*.

دجاج التسمين

- معدل التحويل الغذائي
- ارتفاع متوسط الربح اليومي
- زيادة الوزن النهائي

أُجري الاختبار في إسبانيا. سُلالة كوب *500*. طريقة الاستخدام المتبعة: الأسبوع الأول، *7* أيام: *1* مل / لتر. الأيام *15* و*16* و*17* و*18*، يومان قبل تلقيح داء الغومبورو ويومان بعده. الجرعة: *0.5* مل / لتر. العمر عند الذبح: *47* يوماً. ديسمبر *2012*.





- نسبة أقل من الوفيات
- تجانس أكبر
- ارتفاع متوسط الربح اليومي
- زيادة الوزن النهائي

أُجري الاختبار مع *800* فرخة عمرها *1* يوم من سلالة هايسكس البيضاء. مجموعتان من *100* طائر. أُعيد الاختبار *4* مرات. البرازيل، سبتمبر *2012*.

دجاج لاحم







- نسبة أقل من الوفيات
- تجانس أفضل
- خصوبة أكبر
- معدل تفريخ أعلى
- ارتفاع معدل فقس البيض

أُجري الاختبار في إسبانيا. سلالة روس *308*، *65* أسبوعاً. طريقة الاستخدام المتبعة: الأسبوع الأول، *7* أيام: *1* مل / لتر. الأسابيع *4* و*11* و*18* و*25* و*32*: *3* أيام، بنسبة *0.5* مل / لتر. يناير *2012*.