博力特-L 家禽

L-型氨基酸和维生素

氨基酸

L-丙氨酸7.4g，L-精氨酸 8.6g，L-天冬氨酸10g,L-苯丙氨酸5.8g，L-胱氨酸4.6g，L-谷氨酸17.8g，L-甘氨酸10.3g，L-组氨酸1.5g，L-异亮氨酸5.6g，L-亮氨酸8.7g，L-赖氨酸 7.6g，L-蛋氨酸1.8g，L-脯氨酸11.8g，L-丝氨酸 12g，L-苏氨酸6.2g ,L-酪氨酸3.1g,L-缬氨酸 9.3g

维生素

烟酸胺（Vit.B3）	1.25g	维生素 B6	1.125g
D-泛酰醇	7.5g	肌醇	2.5g
维生素 B1	1.75g	生物素	1 mg
维生素 B2（я к	2.5g		

适应症

- 营养性疾病和营养缺乏。
- 应激期、孱弱和疾病恢复期、家禽换羽期。

主要作用

- 提高动物产能、饲料转化率和成活率。
- 提高产蛋率、受精率、入孵率和鸡群均匀度。

使用剂量和方法

- 口服液。溶于水中饮用。
- 家禽：第1周龄，1000倍稀释，饮用5-7天
- 在生理需求旺盛阶段（应激、疫苗免疫反应、限饲），1000-2000倍稀释饮水。
- 其他动物：每天每kg体重使用2ml，连用4-5天。用于改善动物生产性能、饲料转化率和成活率。

CALIER

LABORATORIOS CALIER, S.A.
Barcelonès, 26 (Pol. Ind. El Ramassar)
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Barcelona (Spain)
Tel: (+34) 938 495 133
laboratorios@calier.es; www.calier.es

LABORATORIOS CALIER, MEXICO, S.A. de C.V.
CALIER PORTUGAL, S.A. PORTUGAL
LABORATORIOS CALIER, DE VENEZUELA, S.A. -VENEZUELA
CALIER POLSKA Sp. zo.o, DE POLONIA
CALIER ITALIA, S.A. ITALIA
LABORATORIOS CALIER DE ARGENTINA, S.A. -ARGENTINA
CALIER Deutschland Gmbh GERMANY
LABORATORIOS CALIER, DE LOS ANDES,S.A. -COLOMBIA
LABORATORIOS CALIER, DE URUGUAY, S.A. -URUGUAY
LABORATOIRES CALIER, MAROC, S.A. -MARRUECOS
HERTAPE CALIER-BRASIL Saude Animal

新配方

家禽

获得最大效益

博力特-L 家禽

L-型氨基酸和维生素

CALIER

博力特-L 家禽

L-型氨基酸和维生素

完全吸收的氨基酸

含所有必需氨基酸和重要氨基酸，完全满足家禽生长、生产需要。所有氨基酸均为L-型，可完全吸收。



高含量

含大量各种氨基酸。肉仔鸡、蛋鸡和种鸡生产中特殊阶段日粮的完美补充。



原液



1000倍稀释

高溶解度

高溶解度的特点使产品利用率更高，同时保证了水箱和水线的正常使用。劣质产品经常发生沉淀和堵塞水线问题。.

博力特-L在硬水中的溶解性

1. 原液
2. 1000 倍稀释
3. 2000 倍稀释



高稳定性

脂溶性维生素极易降解，且导致水线堵塞问题。新配方规避了此问题，保证了产品效力的稳定性，且不影响饮水质量。

竞争产品　　博力特-L不产生油层

另一产品放置24小时可见油层

最佳平衡配方

理想蛋白质标准，满足家禽需要。家禽可获得所需的各种氨基酸，既不过量，也不缺乏。



提高生产性能

种鸡







- 降低死亡率
- 改善均匀度
- 提高受精率
- 提高入孵率
- 提高孵化率

实验在西班牙进行。实验鸡群为65周龄罗斯308。使用方法为：1-7日龄，1000倍稀释饮水；4、11、18、25、32周龄，每周饮用3天，2000倍稀释。

肉仔鸡



- 降低料重比
- 提高日增重
- 提高终期体重

实验地点为西班牙。品种为科宝500。博力特-L使用方法为：1-7日龄：1000倍稀释饮用；15、16、17、18日龄（法氏囊疫苗免疫前2天后2天）：2000倍稀释饮水。47日龄出栏。

均匀度





- 降低死亡率
- 降低料重比
- 提高日增重

实验于2012年9月在巴西进行。800羽1日龄海赛克斯白鸡分为2组，每组设4个重复组，每个重复组100羽。

产蛋鸡





- 改善均匀度
- 提高产蛋性能
- 降低死亡率
- 降低料重比

实验在哥伦比亚用罗曼LSL鸡进行。实施方案：自18周龄开始，每4周进行一次，1000倍稀释饮水。